


พูด

คณะกันต้าเพดทีศ่าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คณะกันต้าเพดทีศ่าสตร์

ฟูฟุ คืออะไร



โรงพยาบาลกันต์กรรบ
คณะกันต้าเพดทีศ่าสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพย়াফেরโดয় หน่วยประชาสัมพันธ์
คณะกันต้าเพดทีศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2405 ต่อ 11188 โทรสาร 0-4320-2862
<http://www.dentistry.kku.ac.th>

DENTISTRY KKU

ມາຮູ້ຈັກໂຄຟັນພຸກັນເດວະ

ปัจจัยที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดแห่งโรค

โรคฟันผุเกิดจากการทำลายฟัน โดยกรดจากเชื้อโรคที่อยู่บนผิว หรือหลุมร่องฟัน โดยมีสาเหตุหลักๆ จาก เชื้อโรคในช่องปาก ซึ่งเจริญได้ดีในแผ่นคราบจลินทรีย์ หรือพลาค (plaque)

การได้รับน้ำตาลจากอาหาร เป็นเวลานาน

บริเวณที่มักเกิดโรค

พื้นมากจะผู้ได้รับเงินบริเวณที่ทำความสะอาดยาก เช่น บริเวณหลุมร่องพื้นบนด้านบดเคี้ยวของพื้นกระถาง หรือบริเวณซอกพื้น และบริเวณที่พื้นห้องน้ำ นอกจากร่อง ในพื้นที่ที่เคี้ยวน้ำและอุดแล้ว ก็ยังมีโอกาสผู้ได้รับตามขอบของวัสดุอุด หรือผู้ใหม่ได้นึ่งจากวัสดุอุดแตก และหลัดไป

ลักษณะและอาการของโรค

พันผุในระยะแรกๆ จะสังเกตได้ยาก เนื่องจากมีการทำลายพื้นที่อยู่มาก จนแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงและไม่มีอาการใดๆ ลักษณะที่พบอาจมีสีขาวขุ่นตามผิวพื้นหรือสีน้ำตาลดำตามร่องพัน แต่ยังไม่มีรูขึ้นเราสามารถป้องกันไม่ให้ลูกกลมต่อได้ โดยการลดอุ่นหัวร้อน และใช้ฟลูออร์ด เพื่อให้เกิดการซ่อมแซมผิวพื้นที่ผู้ได้ดื่มน้ำ ระยะต่อมาหากพันผุเป็นถึงชั้นหน่อพื้นอาจมีอาการเสียบฟันเมื่อวับประทานอาหาร

สามารถรักษาได้โดยการอุดฟัน แต่ถ้าไม่ทำการรักษา ก็จะมีการผุ碌กลามไปจนถึงโพรงประสาทฟัน จะทำให้มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรง และอาจมีฟัน松动ที่ปลายรากฟัน ซึ่งหากฟันผุหลุดถึงโพรงประสาทฟันแล้วว่าจำเป็นต้องรักษา根管ฟัน หรือถอนฟัน

ຈະປ້ອງກັນໄດ້ວຍຢ່າງໄຮ

1. กำจัดแฝ่นคราบจุลทรีย์โดยการแปรงพันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือเข้าและก่อนนอน
 2. ลดอาหาร เครื่องดื่มหรือของหวานที่ใส่น้ำตาลลง ควรลดอาหารที่มีรสหวานจัดและเนียนยวนิดพัน เช่น ทอฟฟี่ ช็อกโกแลต การไม่รับประทานอาหารภายในเมื่ออาหาร อาจช่วยลดโอกาสเกิดพันผืดได้
 3. เลือกินเฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เนื้อ นม ผัก ผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้ที่มีเส้นใย
 4. ใช้ฟลูออโวร์ดอย่างスマ่สมอ เพื่อช่วยให้ผิวพันแข็งแรง และช่วยในการข้อมแซมผิวพันในกรณีที่พันเริ่มผุเล็กน้อย โดยการแปรงพันด้วยยาสีพันผสมฟลูออโวร์ด ใช้น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออโวร์ด หรือพบทันตแพทย์เพื่อเคลือบฟลูออโวร์ด
 5. ในเด็กที่พันกรามขึ้นใหม่ๆ ควรพบทันตแพทย์เพื่อทำการเคลือบหลุมร่องพัน ซึ่งจะช่วยไม่ให้เกิดพันผุบริเวณหลุมร่องพัน
 6. ไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจดูรอยผุและรีบอุดพันเสียแต่เนิ่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก
โทร. 0-4320-2405 ต่อ 11198